



BOITE A OUTILS

CE QUE JE DOIS RETENIR, EN FONCTION DE MON TRAITEMENT DE FOND



▶▶ **Je prends de l'hydroxychloroquine (Plaquenil®)** : ce médicament est toxique pour les yeux ; un bilan ophtalmologique complet (fond d'œil, champs visuel, vision des couleurs, électrorétinogramme) est nécessaire avant le début du traitement puis en moyenne tous les ans.

▶▶ **Je prends de la sulfasalazine (Salazopyrine®)** ; surveillance mensuelle de la NFS, plaquettes, créatinine et transaminases. Consulter en urgence en cas d'éruption et/ou de fièvre.

▶▶ **Je prends du méthotrexate (Novatrex®, Méthotrexate®)** ; surveillance de la NFS, plaquettes, créatinine et transaminases. Consulter en urgence en cas de fièvre, d'infection, d'essoufflement ou de toux anormale. Attention aux interactions avec certains antibiotiques (éviter le Bactrim®) ; les vaccins vivants sont à proscrire.

▶▶ **Je prends du Léflunomide (Arava®)** ; surveillance mensuelle de la tension artérielle, des plaquettes et des transaminases. Consulter en urgence en cas de fièvre, d'infection ou d'éruption.

▶▶ Je suis sous **biothérapies (Enbrel®, Remicade®, Humira®, Mathera®, Orencia®, RoActemra®)**; surveillance de la NFS, plaquettes, créatinine, transaminases. Consulter en urgence en cas de fièvre, d'infection ou d'éruption. Arrêter le traitement avant une chirurgie et reprise après cicatrisation ; les vaccins vivants sont à proscrire. Suivi dermatologique et gynécologique régulier ; vigilance vis à vis des plaies.